



Afgræsset fold med Kæmpe-Bjørneklo med ugræsset areal ved siden af.

Græsning

Græsning er en velegnet og effektiv metode til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Græsning anbefales først og fremmest til arealer med store bestande af Kæmpe-Bjørneklo. Et invaderet område skal græsses mange år i træk (6-10 år) indtil de gamle planter er udpinte og frøbanken er tømt.

Får er særdeles velegnet og mange racer æder planten før al øvrig vegetation. For kvæg er det især Angus, Galloway og Skotsk højlandskvæg m.fl. som er egnet, mens flere danske malkeracer og kødkvæg fravælger planten. Heste er uegnede og undgår helst planten.

Får og kvæg vil efter kort tids tilvænning udvikle præference for Kæmpe-Bjørneklo. Dyrene foretrækker unge, friske planter, og den mest effektive bekæmpelse opnås ved at starte græsningen tidligt i vækstsæsonen (marts!), mens planterne er små. Med tiden vil græsningen bevirke, at der udvikles et dække af græsningstolerante arter, som kan forhindre geninvasion af Kæmpe-Bjørneklo.

På arealer med tætte bestande af Kæmpe-Bjørneklo kan det anbefales at slå planterne en enkelt gang, dels for at give plads til etableringen af andre plantearter og dels for at give dyrene adgang til friske skud. Husdyr med en blandet fødesammensætning har en mindre risiko for at blive negativt påvirket af at spise Kæmpe-Bjørneklo. I få tilfælde kan dyrene få vabler og forbrændinger ved at græsse på arealer med Kæmpe-Bjørneklo.

Der vil ofte være planter af Kæmpe-Bjørneklo uden for heget, som dyrene ikke kan nå. Det er vigtigt at bekæmpe disse planter, f.eks. ved rodstikning eller slåning, for at undgå ny frøspredning til det afgræsede areal.

Egedal Kommune anbefaler græsning fordi det udover indvirkningen på Kæmpe-Bjørneklo ofte har en naturforbedrende effekt.